



KHƠI NGUỒN ĐỔI MỚI - VỮNG BƯỚC NÔNG NGHIỆP

C Ắ M N A N G K Ỹ T H U Ậ T S Ầ U R I Ê N G

10 BÍ QUYẾT CẦN LÀM CHO VƯỜN SẦU RIÊNG SAU THU HOẠCH

14 ngày vàng quyết định hơn 70% thành công của vụ sau

KS. Quang — Tân Nông

TÁC GIẢ

Mở đầu: vì sao vườn phục hồi sai lại mất cả vụ sau

Bán trái xong, đi một vòng vườn: lá cháy, cây đứng đọt, đào nhẹ gốc lên thấy rễ cắm đã thâm. Phản xạ của hầu hết nhà vườn là **bón phân cho cây khỏe lại ngay**.

Đó chính là chỗ mất tiền.

Bón sai lúc thì càng cháy rễ, đọt càng yếu, lá càng mỏng. Tới lúc siết nước làm bông vụ sau, cây không đủ sức: bông ra thưa, xỏ nhụy không đều, thối cổ rễ. Nhiều vườn **lá còn xanh mà rễ đã suy kiệt** — nhìn bên ngoài không thấy gì.

Phục hồi không phải cuộc đua tốc độ. Nó là việc **điều chỉnh lại nhịp sinh lý của cây theo đúng thứ tự**. Làm đúng nhịp thì cây tự khỏe; làm ngược nhịp thì càng đổ tiền càng hỏng.

Cẩm nang này gói lại **10 bí quyết** mà nhà vườn làm đúng thường hay giữ cho riêng mình, theo đúng thứ tự phải làm: **ĐẤT → RỄ → THÂN, CÀNH, LÁ**.

LIVESTREAM MIỄN PHÍ — 14 NGÀY VÀNG PHỤC HỒI SẦU RIÊNG

Tối thứ Năm 24/09, 19h30. Tôi mở kỹ từng mốc ngày, trả lời trực tiếp tình huống vườn của bà con, và quay số tặng 10 phần ORGANIC PRO cho người tham dự.

Đăng ký: <https://agrivova.vn/live-phuc-hoi/>



KHƠI NGUỒN ĐỔI MỚI - VỮNG BƯỚC NÔNG NGHIỆP

PHẦN 1 — ĐỌC ĐÚNG NHỊP CÂY

Bí quyết 1 — Cho cây nghỉ trước khi bón bất cứ thứ gì

Cắt trái xong, cây đang ở trạng thái kiệt: toàn bộ dinh dưỡng đã dồn vào trái, bộ rễ cám đã hư một phần trong lúc nuôi trái.

- **Vườn bình thường:** cho cây nghỉ **7–15 ngày**.
- **Vườn mang trái nhiều, cây suy rõ:** nghỉ **15–20 ngày**, dưỡng lá và bón hữu cơ trước, **rồi mới kích rễ**.

Trong những ngày nghỉ này **không bón phân hoá học**. Đây không phải là "để cây tự bơi" — đây là để rễ hư ngừng thối thêm, đất hạ nhiệt, cây tự cân lại trước khi mình can thiệp.

Hỏi lại vườn mình: cắt trái xong ngày nào? Không nhớ ngày thì không tính được mốc. Ghi lại ngày cắt là việc đầu tiên.

Bí quyết 2 — Dọn vườn xong mới bón

Mấy việc dưới đây tốn công, không tốn tiền, nhưng bỏ qua thì bón bao nhiêu cũng phí:

- **Cắt cuống trái còn sót** và cành khô, cành bệnh.
- **Cắt dây nịt cành** — chỗ dây siết lúc căng trái là vết thương, mùa mưa chính là cửa cho nấm xì mủ đi vào thân.
- **Khơi rãnh thoát nước**. Đất bằng thì đào 2–3 hố nhỏ quanh gốc cho nước rút.
- **Không làm bồn quanh gốc**. Bồn giữ nước lại ngay chỗ cổ rễ — đúng chỗ dễ chết cây nhất.

Bí quyết 3 — Đi đúng thứ tự, đừng đảo

Thứ tự này là thứ tự sinh lý của cây, không phải quy ước của người bán phân:

`` ĐẤT → RỄ → THÂN / CÀNH / LÁ ``

Và trong phần dinh dưỡng cũng có thứ tự riêng:

`` Hữu cơ lỏng / Fulvic → NPK 3 số cân bằng nhẹ → Đạm cao ``

Đạm cao chỉ được bón khi rễ đã khỏe. Bón đạm vào lúc rễ chưa hồi thì cây bung đọt bằng vốn dự trữ trong thân — nhìn thì xanh, nhưng là vay trước sức của vụ sau.

BÀ CON ĐANG PHỤC HỒI VƯỜN?

Nhắn cho kỹ sư ngày cắt trái + tuổi cây + loại đất, tôi soạn giúp lịch 14 ngày cho đúng vườn của mình, không tính phí.

Vào nhóm tại: <https://agrivova.vn/live-phuc-hoi/>



KHƠI NGUỒN ĐỔI MỚI - VỮNG BƯỚC NÔNG NGHIỆP

PHẦN 2 — ĐẤT VÀ RỄ, PHẦN QUYẾT ĐỊNH

Bí quyết 4 — Kích rễ là tưới gốc, không phải phun lá

Đây là lỗi tốn tiền phổ biến nhất. Phun lên lá để mong ra rễ là **vô ích** — chất kích rễ phải đi tới vùng rễ mới có tác dụng.

- **Ưu tiên tưới gốc.**
- **2–3 lần mỗi coi, cách nhau 5–7 ngày.**
- **Luân phiên hoặc kết hợp 1–2 loại**, dùng phối 4–5 thứ vào cùng một cứ. Trộn càng nhiều càng dễ tương kỵ, và khi có kết quả cũng không biết nhờ cái nào.

Nguyên lý cần nhớ: **cây phải ra rễ trước, rễ mới sinh hormone để bật chồi**. Kích rễ mà đòi ra đọt ngay là đi ngược sinh lý.

Bí quyết 5 — Thấy đầu rễ trắng thì ngừng

Nhà vườn hay hỏi "kích mấy cứ là đủ?". Câu trả lời không nằm ở số cứ, nằm ở **bộ rễ**.

Moi nhẹ lớp đất mặt quanh tán, thấy **đầu rễ cám trắng** nghĩa là đã đạt — **ngừng kích**. Kích tiếp nữa là ép cây làm việc quá sức trong lúc chưa có bộ lá nuôi lại.

Bộ rễ là thứ duy nhất nói thật về tình trạng cây. Đừng chấm điểm vườn bằng màu lá.

Bí quyết 6 — Hiểu đúng hai thứ hay bị hiểu sai

Humic không phải thuốc kích rễ. Nó là **môi trường** — tạo điều kiện cho rễ phát triển, chứ không ra lệnh cho rễ mọc. Ai bán humic như thuốc kích rễ là nói sai bản chất. Mùa mưa nên dùng dạng viên để khỏi trôi.

Trichoderma phải bón sớm. Nấm này cần **20–30 ngày** mới tiết đủ men để làm việc. Bón trễ rồi trách "dùng không thấy gì" là oan cho sản phẩm — và oan cho cả tiền mình bỏ ra.

Bí quyết 7 — Bón đất đúng thứ, tránh hai thứ

Nên có:

- **Hữu cơ hoai** rải quanh tán khi rễ non đã nhú, kèm **Trichoderma** và men vi sinh.
- **Lân nung chảy** khoảng **nửa liều làm bông** (cây 5 năm khoảng 2,5 kg). Loại này pH cao, trung hoà đất chua, tan chậm cả tháng nên không gây sốc.
- Tỷ lệ tham khảo: **1 phần hoá học — 3 đến 4 phần hữu cơ**.

Tránh:

- **Vôi**. Vôi làm đất chai, xơ, nóng, dễ cháy rễ non đang nhú.
- **DAP**. Ngoài chuyện nóng, đây còn là đường vào của Cadimi — thứ đang bị soi ở cửa khẩu xuất khẩu. Vườn làm hàng xuất nên tránh từ gốc.

COMBO PHỤC HỒI ĐANG ĐÚNG MÙA

Đúng thứ tự đất → rễ → lá, không phải gom nhiều chai cho đủ bộ. Kỹ sư tính liều theo tuổi cây và diện tích vườn của bà con.

Xem và hỏi giá:

<https://agrivova.vn/live-phuc-hoi/>



KHƠI NGUỒN ĐỔI MỚI - VỮNG BƯỚC NÔNG NGHIỆP

PHẦN 3 — LÁ, TÁN VÀ MÙA MƯA

Bí quyết 8 — Mùa mưa: đất nhão dính tay thì chưa rải phân hạt

Bón phân hạt lúc đất đang nhão thì phân tan nhanh, trôi theo nước, phần còn lại đọng quanh cổ rễ gây nóng. Tiền trôi ra mương, hạt thì ở lại trong vườn.

Nguyên tắc mùa mưa:

- Bóp thử đất: **còn nhão dính tay thì khoan bón hạt**, ưu tiên dạng nước tưới gốc hoặc humic viên.
- Thoát nước trước, bón sau.
- Cây đang úng thì **khơi mương, đào hố rút nước** — không bón thêm gì cho tới khi đất ráo.

Bí quyết 9 — Nuôi coi đợt 1 theo đúng ba chặng

Coi đợt đầu tiên sau thu là bộ lá nuôi cả vụ sau, chăm theo ba chặng:

Chặng	Việc cần làm
Đợt vừa chớm	Amino + vi lượng (sắt, kẽm, mangan, bo) để lá ra đều
Lá mũi giáo	Canh rầy kỹ — đây là lúc rầy phá mạnh nhất, mất đợt lá này là mất cả coi
Lá lựa	Bổ sung magie và kẽm cho lá dày, xanh bền

Coi 1 ra đều, dày, xanh sẫm là tín hiệu cây đã thật sự hồi.

Bí quyết 10 — Tỉa tán chỉ khi đủ ba điều kiện

Đừng cầm kéo trong ba tuần đầu. Chỉ tỉa sau **25–35 ngày**, và phải đủ **cả ba**:

1. **Ngày nắng khô** — làm trong khoảng 8 đến 10 giờ sáng.
2. **Lá đã lựa** (đã già).
3. **Cây khoẻ**, không đang suy.

Cấm cắt khi trời mưa dầm, khi coi còn non, hoặc đang lúc giao mùa.

Cắt xong: **sát má kéo**, và ngay chiều hôm đó phun hoặc quét thuốc trừ nấm lên vết cắt theo hướng dẫn trên nhãn. Vết cắt để trần qua đêm mùa mưa là mồi nấm vào thân.

Mức tỉa quyết định số coi đợt: tỉa mạnh, bỏ 50–60% lá thì cây thường đi khoảng 4 coi.



KHƠI NGUỒN ĐỔI MỚI - VỮNG BƯỚC NÔNG NGHIỆP

PHẦN 4 — TỰ CHĂM VƯỜN MÌNH

Phiếu chấm: vườn mình đang ở mức nào?

Câu nào đúng với vườn mình thì tính 1 điểm.

#	Câu	Đúng?
1	Cắt trái xong tôi để cây nghỉ ít nhất 7 ngày, chưa vội bón hoá học	☐
2	Tôi đã cắt hết cuống trái sót, cành khô và cành bệnh	☐
3	Tôi đã cắt dây nịt cành	☐
4	Rãnh thoát nước trong vườn thông, không đọng sau mưa	☐
5	Tôi đã moi gốc xem rễ cám, biết rễ đang trắng hay thâm	☐
6	Tôi kích rễ bằng cách tưới gốc, không chỉ phun lá	☐
7	Tôi chưa bón đạm cao khi rễ chưa ra lại	☐
8	Đất còn nhão dính tay thì tôi chưa rải phân hạt	☐
9	Tôi chưa cắt tỉa mạnh trong 3 tuần đầu sau thu	☐
10	Tôi có ghi lại ngày cắt trái để tính mốc	☐

8–10 điểm — vườn đang đi đúng nhịp. Giữ nhịp, lo tiếp phần hữu cơ và Trichoderma, chờ coi 1 ổn định rồi mới tính tỉa tán.

5–7 điểm — vườn đang mệt. Chưa hỏng, nhưng đang lệch nhịp. Quay lại đúng thứ tự đất → rễ → lá, tạm dừng mọi việc ở phần lá cho tới khi rễ cám trắng trở lại.

0–4 điểm — vườn đang kiệt sức. Rủi ro thật nằm ở chỗ vụ sau cây không đủ sức làm bông. Ngưng phân hoá học, xử lý đất và rễ trước, moi gốc kiểm tra rễ cám. Rễ đã thâm đen thì hỏi kỹ sư trước khi bón thêm bất cứ thứ gì.

Lịch 14 ngày vàng, in ra treo chòi

Mốc	Việc chính
0–7 ngày	Cây nghỉ, không bón hoá học. Vệ sinh vườn, cắt cuống sót và cành bệnh, cắt dây nịt cành, khơi rãnh
7–14 ngày	Giải độc đất, kích rễ tơ bằng cách tưới gốc. Rễ non nhú thì bón hữu cơ hoai + Trichoderma
Coi đợt 1	Amino + vi lượng; lá mũi giáo canh rầy; lá lựa bổ sung magie, kẽm
14–35 ngày	Chỉnh tán khi coi 1 đã ổn định và đủ ba điều kiện tỉa

Ba điều tôi nói thẳng để bà con khỏi mất tiền oan

1. Không có sản phẩm nào "dùng vào là hết rụng trái". Rụng sinh lý là chuyện tự nhiên của cây.

2. **Cơ đã sượng thì không cứu được.** Sượng là bệnh phải phòng từ lúc nuôi trái, không phải chuyện chữa.

3. **Lá đã vàng thì không xanh lại.** Việc làm được là giữ lá mới và ngăn lan, chứ không "hồi sinh" lá cũ.

Ai hứa với bà con ba điều ngược lại, nên hỏi kỹ trước khi xuống tiền.

Bước tiếp theo

Cẩm nang này là phần khung. Vườn mỗi nhà một kiểu: tuổi cây khác, đất khác, ngày cắt khác, nên liều lượng và mốc ngày cũng khác.

TỐI THỨ NĂM 24/09, 19h30 — LIVESTREAM "14 NGÀY VÀNG PHỤC HỒI SẦU RIÊNG"

Tôi đi kỹ từng mốc ngày, nhận câu hỏi trực tiếp về vườn của bà con, và quay số tặng **10 phần**

ORGANIC PRO cho người tham dự.

Đăng ký và vào nhóm Zalo:

<https://agrivova.vn/live-phuc-hoi/>

Tài liệu do KS. Quang — Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Tân Nông biên soạn, dựa trên quy trình canh tác sầu riêng và kinh nghiệm đồng hành cùng nhà vườn Miền Đông, Tây Nguyên và Miền Tây. Số liệu chi phí, liều lượng mang tính tham khảo, cần điều chỉnh theo tình trạng thật của từng vườn.



KHƠI NGUỒN ĐỔI MỚI - VỮNG BƯỚC NÔNG NGHIỆP

14 ngày vàng quyết định hơn 70% thành công của vụ sau